

NR. 3823 /04.07.2022

Protocol de Profilaxie post-mușcătură de căpușă

Îndepartarea / extragerea completă și cât mai curând după mușcătură, a căpușei, la nevoie, chirurgical

Curățarea zonei cu apă și săpun din abundență și aplicarea de betadină soluție, până la vindecarea leziunii

Profilaxie cu antibiotic:

Profilaxia cu antibiotic este recomandată doar în situația în care căpușa a fost fixată la piele, astfel:

La adult Doxicilină: 200 mg în priză unică, respectiv 2 comprimate a câte 100mg, po

La copilul > 8 ani: Doxicilină 4mg/kg corp(maximum 200mg) în priză unică, po

La copilul < 8 ani: Amoxicilină 50mg/kg corp, în 3 prize/zi, timp de 1 zi, po

Claritromicină (în caz de alergie la Betalactamine) 15mg/kg corp,
doză unică, po

Profilaxia antitetanică nu este indicată.

Atenție : dacă în decurs de 7-21 de zile de la mușcătură apare o zonă eritematoasă centrată de locul mușcăturii de căpușă, pacientul se prezintă la spitalul de boli infecțioase.

Măsuri de prevenire a expunerii la căpusă:

- Se evită zonele cu iarba și arbuști, în care expunerea la căpușe este foarte mare.
- În situația în care există acest risc de expunere, se recomandă purtarea de haine de culoare deschisă, pentru a face cât mai ușor vizibile insectele,inclusiv căpușele.
- Se recomandă aplicarea de spray-uri împotriva insectelor
- Se recomandă verificarea atentă a hainelor, a bagajelor și a corpului, la întoarcerea din drumeții
- Se recomandă și verificarea animalelor de companie.
- Se recomandă protejarea animalelor de companie cu produse recomandate de medicul veterinar, împotriva insectelor, inclusiv a căpușelor.

DIRECTOR MEDICAL
DR. GRECU TAMARA

TAMARA GRECU
medic specialist
medicina internă